

FARMACOVIGILANCIA SOBRE SULFATO FERROSO TABLETAS



Durante los dos últimos años a nivel de la base de datos de la DIRESA Lima se han registrado 7 reportes de sospecha de reacción adversa a sulfato ferroso tabletas, que van desde náusea, vómitos y estreñimiento, los reportes fueron en mujeres embarazadas y en etapa de lactancia, sus edades fluctuaban de 25 a 41 años. En ningún caso se evidencia que se les administró otros medicamentos.



Por ello te recomendamos tomar el sulfato ferroso con abundante agua y con el estómago vacío, si hay intolerancia puedes tomarlo con alimentos, excepto derivados lácteos, huevos, café, té y cereales. En caso de gestantes el personal de salud debe monitorizar su administración hasta culminar el embarazo e identificar alguna posible reacción adversa

INDICACIONES

El sulfato ferroso está indicado en:

- Anemia ferropénica.
- Deficiencia de hierro por pobre ingesta o requerimiento incrementado.
- Suplementación en grupo de riesgo como el embarazo.

CONTRAINDICACIONES

El sulfato ferroso se encuentra contraindicado en:

- Hipersensibilidad al sulfato ferroso.
- Anemia no ferropénica.
- Hemosiderosis.
- Hemocromatosis.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Si estás tomando tetraciclina o ciprofloxacino en simultáneo, debes tomar 3 horas antes o 2 horas después del sulfato ferroso.
- No debes tomarlo junto a antiácidos.
- No te preocupes si tus heces se oscurecen.
- No olvides dejar el medicamento fuera del alcance de los niños.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones más frecuentes son: náusea, estreñimiento, pirosis (ardor, quemazón en el estómago), heces oscuras, sabor metálico.

Los vómitos, edema y diarrea son poco frecuentes.

Fuente:

1. Base de datos VigiFlow
2. Ficha técnica Sulfato ferroso

**FICHA
INFORMATIVA
N° 01-2024**

Como paciente puedes notificar la sospecha de reacción adversa escaneando el código QR

